

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

PARA IDOSOS E GESTANTES – ROTINA

IDOSOS

Recebe uma dose a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.



GESTANTES

Recebe uma dose em qualquer momento da gestação e em cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas

 DOSE (REGISTRO D)



ATENÇÃO!

1) Moderna (Spikevax)

- * Menor de 12 anos: dose 0,25 ml
- * A partir de 12 anos: dose de 0,5 ml

2) Pfizer (Comirnaty)

- * Menor de 12 anos: dose 0,3 ml, (tampa azul), dose 0,2 ml (tampa laranja)
- * A partir de 12 anos: dose 0,3 ml

3) Serum/Zalika

- * A partir de 12 anos: dose de 0,5 ml

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS*

INDEPENDENTEMENTE DO RECEBIMENTO OU NÃO DE DOSES PRÉVIAS - FAZER UMA DOSE COM A VACINA DISPONÍVEL PARA A FAIXA ETÁRIA

 — UMA DOSE ANUAL (REGISTRA COMO 'D')



Qual a vacina indicada para faixa etária de 5 a 11 anos?

Pfizer Pediátrica (Comirnaty) ou Moderna (Spikevax).

Qual a vacina indicada para faixa etária a partir de 12 anos?

Pfizer (Comirnaty) ou Moderna (Spikevax) ou Serum/Zalika.

Qual o volume da dose?

5 a 11 anos: 0,25 ml (vacina Moderna); 0,2ml (vacina Pfizer tampa laranja) e 0,3 ml (vacina Pfizer tampa azul).

A partir de 12 anos: 0,5 ml (Vacinas Moderna e Serum/Zalika)

Qual a estratégia?

Especial



Crianças a partir de 5 anos de idade que **NÃO** fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose de vacinas covid-19) poderão receber **UMA DOSE** de vacina Covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária.



*Grupos para a vacinação especial contra a covid-19: Pessoas vivendo em instituições de longa permanência; Pessoas imunocomprometidas; Indígenas vivendo em terra indígena; Indígenas vivendo fora da terra indígena; Ribeirinhos; Quilombolas; Puérperas; Trabalhadores da saúde; Pessoas com deficiência permanente; Pessoas com comorbidades; Pessoas privadas de liberdade; Funcionários do sistema de privação de liberdade; Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e Pessoas em situação de rua.

PESSOAS IMUNOCOMPROMETIDAS A PARTIR DE 5 ANOS

Esquema primário: 5 a 11 anos



Caso já tenha recebido o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber 2 doses da vacina, com intervalo mínimo de 6 meses entre as doses.

Esquema primário: a partir de 12 anos



PESSOAS IMUNOCOMPROMETIDAS QUE ESTÃO COM O ESQUEMA DE VACINAÇÃO INCOMPLETO DEVERÃO COMPLETAR O ESQUEMA DE TRÊS DOSES COM O IMUNIZANTE DISPONÍVEL E A DOSE PARA A IDADE.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Farmacêutica	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Moderna (Spikevax)	Serum/Zalika
Vacina	RNAm, Pfizer Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica para menores de 5 anos Cepas XBB 1.5 e JN.1	Vacina de RNA mensageiro Cepas XBB 1.5 e JN.1	Vacina Covid-19 recombinante Cepas XBB 1.5
Faixa Etária	A partir de 12 anos de idade	5 a 11 anos de idade	5 a 11 anos de idade	6 meses a 4 anos de idade	A partir de 6 meses	A partir de 12 anos de idade
Via de Administração	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular
Apresentação	Frasco ampola multidoso de 6 doses (Diluída)	Frasco ampola multidoso de 6 doses (Diluída)	Frasco ampola multidoso de 10 doses (Diluir antes de usar)	Frasco ampola multidoso de 10 doses (Diluir antes de usar)	Frasco ampola multidoso de 5 doses	Frasco ampola multidoso de 5 doses
Temperatura e tempo de transporte	-90°C a +8°C (10 semanas); Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a +8°C (10 semanas); Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a +8°C (10 semanas); Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a +8°C (10 semanas); Não tem limite de tempo para transporte	+2°C a +8°C: até 36h -50°C a -15°C: Não tem limite de tempo para transporte	+2°C a +8°C: Não tem limite de tempo para transporte
Validade Multidoso Fechado	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C à -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C à -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C à -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C à -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (30 dias) -50°C a -15°C (12 meses)	+2°C a +8°C (12 meses)
Validade Multidoso Aberto	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	19 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C
Quantidade de Diluente	-	-	1,3 ml	2,2 ml	-	-
Volume da Dose	0,3 ml	0,3 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,25ml (6 meses a 11 anos) 0,5ml (12 anos mais)	0,5 ml

Fontes: Bula da vacina Covid-19, Pfizer, Cominarty®; bula da vacina Covid-19-RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19 (recombinante), Serum/Zalika