## Leiomioma de Útero

## Termo de Esclarecimento e Responsabilidade Gosserrelina, Leuprorrelina, Triptorrelina

Eu,							(nome	da	paciente),
declaro ter sid	do informada	claramente	sobre os l	benefícios,	riscos,	contra-	indicaçõ	es e	principais
efeitos adverso	os relacionado	s ao uso de	gosserreli	na, leupro	rrelina e	e tripto	relina ir	ndica	dos para o
tratamento do I	leiomioma de	útero.							
Os termo	os médicos fo	ram explicad	los e todas	as minhas	dúvida	s foram	resolvid	las pe	elo médico
					(no	ome do	médico (	que p	rescreve).
Assim de	eclaro que:								
Fui clara	mente informa	ida de que o	medicame	ento que pa	sso a re	ceber p	ode traz	er as	seguintes
melhorias:									

- diminuição da dor; e
- redução dos nódulos endometrióticos.

Fui também claramente informada a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos colaterais e riscos do uso do medicamento:

- · contraindicado para gestantes ou para mulheres planejando engravidar;
- contraindicado para mulheres amamentando;
- efeitos adversos da gosserrelina freqüentes: calorões, distúrbios menstruais; menos freqüentes: visão borrada, diminuição da libido, cansaço, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dificuldade para dormir, ganho de peso, vaginite; raros: angina ou infarto do miocárdio, tromboflebites;
- efeitos adversos da leuprorrelina freqüentes: calorões, diarréia, distúrbios menstruais; menos freqüentes: arritmias cardíacas, palpitações; raros: boca seca, sede, alterações do apetite, ansiedade, náuseas, vômitos, desordens de personalidade, desordens da memória, diminuição da libido, ganho de peso, dificuldades para dormir, delírios, dor no corpo, perda de cabelo e distúrbios oftalmológicos;
- efeitos adversos da triptorrelina freqüentes: calorões, dores nos ossos, impotência, dor no local da injeção, hipertensão, dores de cabeça; menos freqüentes: dores nas pernas, fadiga, vômitos, insônia; raros: tonturas, diarréia, retenção urinária, infecção do trato urinário, anemia, prurido;
- contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos;
- o risco de ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo(s) caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei ser assistida, inclusive em caso de eu desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.

ied tratamento, desde que assegurado o anominato.	
O meu tratamento constará do seguinte medicamento:	
□ gosserrelina	
□ leuprorrelina	
□ triptorrelina	



## Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

Local:	Data:								
Nome do paciente:									
Cartão Nacional de Saúde:									
Nome do responsável legal:									
Documento de identificação do responsável legal:									
Assina	tura do paciente ou do responsáv	el legal							
Médico responsável:		CRM:	UF:						
_		_							
	Assinatura e carimbo do médico								
	Data:								

**Observação:** Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou a seu responsável legal.