



VERSÃO BRASILEIRA DO ESCORE DE BIRMINGHAM DE ATIVIDADE DE DOENÇA DE VASCULITES VERSÃO 3 (BVAS.3)

ID do Paciente:				Data de nascimento:				Escore final			
Examinador:				Data da avaliação:							
Marque um item apenas se for atribuído à vasculite ativa. Se não houver anormalidade em uma seção, por favor, marcar "Nenhum" para o órgão/sistema.				Se todas as anormalidades forem decorrentes de doença persistente (vasculite ativa que não é nova/pior que nas quatro semanas antecedentes), marcar a caixa de PERSISTENTE no canto inferior direito.							
Essa é a primeira avaliação do paciente?				O Sim				O Não			
				Nenhum				Doença Ativa			
				Nenhum				Doença Ativa			
1. Geral				6. Cardiovascular							
Mialgia				Ausência de pulso							
Artralgia/ Artrite				Doença valvar cardíaca							
Febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$				Pericardite							
Perda de Peso ≥ 2 kg				◆ Dor cardíaca isquêmica							
2. Cutâneo				◆ Cardiomiopatia							
Infarto				◆ Insuficiência cardíaca congestiva							
Púrpura				7. Abdominal							
Úlcera				Peritonite							
◆ Gangrena				Diarreia sanguinolenta							
Outras vasculites cutâneas				◆ Dor abdominal isquêmica							
3. Membranas mucosas/olhos				8. Renal							
Úlceras orais				Hipertensão							
Úlceras genitais				Proteinúria $> 1+$							
Inflamação anexial				◆ Hematúria ≥ 10 hemácias/ campo							
Proptose significativa				Creatinina sérica 125-249 $\mu\text{mol/L}$ * (1.41–2.82 mg/dL)							
Esclerite/Episclerite				Creatinina sérica 250-499 $\mu\text{mol/L}$ * (2.83–5.64 mg/dL)							
Conjuntivite/Blefarite/Ceratite				◆ Creatinina sérica $\geq 500 \mu\text{mol/L}$ * (≥ 5.66 mg/dL)							
Visão embaçada				◆ Aumento na creatinina sérica $> 30\%$ ou queda no clearance de creatinina $> 25\%$							
Perda de visão repentina				*Só pode ser avaliado na primeira avaliação							
Uveíte				9. Sistema Nervoso							
◆ Alterações na retina (vasculite/ trombose/ exsudato/ hemorragia)				Cefaleia							
4. Ouvido, nariz e garganta				Meningite							
Secreção nasal sanguinolenta/ crostas/úlceras/granulomas nasais				Confusão orgânica							
Envolvimento dos seios paranasais				Convulsão (não hipertensiva)							
Estenose subglótica				◆ Acidente vascular cerebral							
Perda auditiva condutiva				◆ Lesão na medula espinhal							
◆ Perda auditiva neurosensorial				◆ Paralisia de nervo craniano							
5. Tórax				Neuropatia periférica sensorial							
Sibilância				◆ Mononeurite múltipla motora							
Nódulos ou cavidades				10. Outros							
Efusão pleural/pleurisia				a.							
Infiltrado				b.							
Envolvimento endobrônquico				c.							
◆ Hemoptise maciça/hemorragia alveolar				Apenas para doença PERSISTENTE							
◆ Falência respiratória				(Marque aqui se todas as anormalidades são decorrentes de uma doença persistente)							

Referência:

VIEIRA, A. T. P., ARAÚJO, D. K. L., CAMPOS, K. V. M., MELO, A. K. G., BRITO, D. C. S. E., FREIRE, E. A. M., & BRAZ, A. S. TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO BIRMINGHAM VASCULITIS ACTIVITY SCORE VERSION 3 SOBRE ATIVIDADE DE DOENÇA EM PACIENTES COM VASCULITES SISTÊMICAS PRIMÁRIAS. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 57, p. S373-S374, 2017.