



CEAF-Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

**ANEXO PARA SOLICITAÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG**  
**CRITÉRIO DE INCLUSÃO ESPECIAL**  
**(Doença Falciforme CID 10: D57.0; D57.1; D57.2)**

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

PACIENTE COM **IDADE IGUAL OU MAIOR QUE 2 ANOS** DEVERÁ APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE:

- O CRITÉRIO A
- UM DOS CRITÉRIOS ENTRE B E L NOS ÚLTIMOS 12 MESES

A) Pacientes devem ser acompanhados em centro de referência com hematologista e devem apresentar: 1) eletroforese de hemoglobina compatível com o diagnóstico de DF: Hb SS, SC, SD ou SBetaTal; 2) possibilidade de comparecer às reavaliações periódicas; 3) beta-HCG sérico negativo para mulheres em idade reprodutiva;
B) três ou mais episódios de crises vasclusivas com necessidade de atendimento médico;
C) dois episódios de síndrome torácica aguda (definida como dor torácica aguda com infiltrado pulmonar novo, febre de 37,5° C ou superior, taquipneia, sibilos pulmonares ou tosse);
D) um episódio de priapismo grave ou priapismo recorrente;
E) necrose isquêmica óssea;
F) insuficiência renal;
G) proteinúria de 24 h maior ou igual a 1 g;
H) anemia grave e persistente (Hb menor que 6 g/dL em três dosagens no período de 3 meses);
I) desidrogenase láctica (DHL) elevada duas vezes acima do limite superior nas crianças ou adolescentes e acima de três vezes do limite superior no adulto;
J) alterações no eco-Doppler transcraniano acima de 160 e até 200 cm/s;
K) retinopatia proliferativa;
L) quaisquer outras situações em que haja comprovação de lesão crônica de órgão(s);

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo do médico

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



CEAF-Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

**ANEXO PARA SOLICITAÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG  
CRITÉRIO DE INCLUSÃO ESPECIAL  
(Doença Falciforme CID 10: D57.0; D57.1; D57.2)****PACIENTE:** \_\_\_\_\_PACIENTE COM **IDADE ENTRE 9 MESES E 2 ANOS DE IDADE** DEVERÁ APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE:

- O CRITÉRIO A
- UM DOS CRITÉRIOS ENTRE B E L NOS ÚLTIMOS 12 MESES
- UM DOS CRITÉRIOS ENTRE M E O

A) Pacientes devem ser acompanhados em centro de referência com hematologista e devem apresentar: 1) eletroforese de hemoglobina compatível com o diagnóstico de DF: Hb SS, SC, SD ou SBetaTal; 2) possibilidade de comparecer às reavaliações periódicas; 3) beta-HCG sérico negativo para mulheres em idade reprodutiva;
B) três ou mais episódios de crises vasclusivas com necessidade de atendimento médico;
C) dois episódios de síndrome torácica aguda (definida como dor torácica aguda com infiltrado pulmonar novo, febre de 37,5° C ou superior, taquipneia, sibilos pulmonares ou tosse);
D) um episódio de priapismo grave ou priapismo recorrente;
E) necrose isquêmica óssea;
F) insuficiência renal;
G) proteinúria de 24 h maior ou igual a 1 g;
H) anemia grave e persistente (Hb menor que 6 g/dL em três dosagens no período de 3 meses);
I) desidrogenase láctica (DHL) elevada duas vezes acima do limite superior nas crianças ou adolescentes e acima de três vezes do limite superior no adulto;
J) alterações no eco-Doppler transcraniano acima de 160 e até 200 cm/s;
K) retinopatia proliferativa;
L) quaisquer outras situações em que haja comprovação de lesão crônica de órgão(s);
M) dactilite (no primeiro ano de vida);
N) concentração de Hb menor que 7 g/dL (média de 3 valores fora de evento agudo);
O) contagem de leucócitos maior que 20.000/mm <sup>3</sup> (média de 3 valores fora de evento agudo).

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo do médico\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data